



D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la
Protection des Végétaux
93, rue de Curambourg
45404 Fleury les Aubrais
Tél. 02.38.22.11.11
Fax 02.38.84.19.79
SRPV.DRAF-CENTRE@
agriculture.gouv.fr

Imprimé à la Station
d'Avertissements agrico-
les de la Région CENTRE
La Directrice-Gérante :
M. HANRION
Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 80530
ISSN n° 0757-4029

Diffusion en collabora-
tion avec la FREDEC
CENTRE (Art L252-1 à
L252-5 du Code Rural)

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP 13-11-0252671

REGION CENTRE

www.srpv-centre.com

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Bulletin technique n° 39 du 07/11/2002 - 2 pages

Colza

Stades : "8 à 10 feuilles".

Charançon du bourgeon terminal

Les conditions climatiques ont à nouveau été favorables au vol **en fin de semaine dernière** ; des **captures** ont été signalées dans plusieurs secteurs :

- Indre et Loire : Dame Marie les Bois (1 charançon), Autrèche (1), Auzouer (1) ;
- Cher : Avord (3), Villeneuve/Cher (8), Oizon (1), St Loup des Chaumes (5) ;
- Indre : Bouges le Château (5) ;
- Loir et Cher : Villefrancoeur (et aussi à Brévainville, St Laurent des Bois, Courbouzon, La Chapelle St Martin, Villero-main, St Amand, Les Hermites, Mazan-gé, source *Chambre d'Agriculture*) ;
- Loiret : Gyles Nonains (23), Boynes (7), Formaville (3), Coudray (14), La Cour Marigny (22), Chantecoq (35), St Maurice/A. (1), Adon (4), Férolles (3) ;
- Eure et Loir : Bonneval (9), Le Puiset (9), Ormoy (15), Le Chatellier N. D. (12), Mesnil Thomas (2).

Pas de capture dans les sites suivants :

- Indre et Loire : Chaveignes, Chambourg ;
- Cher : Rians, Ste Solange, Vornay ;
- Indre : Meunet/Vatan, Sassièges St Germain, Vicq/Nahon, Neuvy Pailloux, Mûrs, Châteauroux ;
- Loir et Cher : St Martin des Bois, Romilly du Perche, Savigny/B., Vallières les G. ;
- Loiret : Chilleux aux Bois ;
- Eure et Loir : Ecublé.

Les observations des femelles montrent que la maturité des œufs a avancé, et que certaines sont prêtes à pondre.

Dans les sites où des captures ont été observées, intervenez cette semaine ou au plus tard en début de semaine pro-chaine.

Céréales

Stades : "levée" à "3 feuilles".

Pucerons

- A la tour à **succion**, on observe que quelques jours ont été assez favorables au vol (lundi 28 et jeudi 31) ; on remarque

ainsi (voir courbe page suivante) une aug-
mentation du nombre de captures inhabi-
tuelle à cette époque.

- Toutefois, les observations faites sur **pots-pièges** (voir tableaux page suivante) et au **champ** montrent que les pucerons n'ont pas réussi à s'installer et à se multiplier de façon importante (pluie et vent).

Ainsi, le niveau de population a **peu évolué** : le pourcentage de plantes atteintes reste stable ou augmente légèrement, on n'observe que des **pucerons isolés**, mais aucune colonie.

Quelques exemples :

- Indre et Loire : Chambourg ("2 feuilles", 10 % de plantes atteintes), Courcoué ("2 feuilles", 0 %), Auzouer ("2 feuilles", 0 %), Dame Marie les Bois ("1 feuille", 12 %) ;
- Cher : Oizon ("3 feuilles", 0 %), Ste Solange ("2 feuilles", 6 à 10 %), Avord ("2 feuilles", 0 %), Vornay ("2 feuilles", 0 %) ;
- Loiret : Treilles ("1 feuille", 6 %), Chan-tecoq ("2 feuilles", 6 %), Chuelles ("1 feuille", 0 %), St Maurice/A. ("1 feuille", 3 %), Poilly lez Gien ("1 feuille", 2 %) ;
- Eure et Loir : Le Puiset ("1-2 feuilles", 14 et 20 %), Bonneval ("2 feuilles", 8 %).

Rappel du seuil d'intervention : 10 % de plantes atteintes.

Continuer la surveillance.

Cicadelles

Elles sont en diminution ; l'absence de larves sur les pièges montre que les popu-lations sont vieillissantes et ne se renou-
vellent pas.

Les conditions climatiques leur sont très défavorables ; elles sont donc peu actives.

Pas d'intervention.

Remarque : on observe par contre, sur les pièges englués et dans les cuvettes jau-
nes, de nombreuses cicadelles **non nui-sibles** au blé.

Trèfle semence

Sclérotinia (*S. trifoliorum*)

On observe les premières **apothécies** (organes qui produisent les spores) de-puis le 6 novembre en plusieurs lieux :
Bourges (18), Issoudun (36).

On observe également des **stipes** (stade



Le prochain bul-
letin sera édité le
Jeudi 21/11/02

Colza

- Charançon du
bourgeon ter-
minal : interven-
tion dans les
secteurs où il y a
eu captures

Céréales

- Pucerons :
intervention
parfois néces-
saire, faire une
observation au
champ
- Cicadelles :
faibles popula-
tions, peu
d'activité

Trèfle

semence

Sclérotinia :
intervention à
prévoir

752

SRPV
S&T


D340J 43155

préliminaire à l'apparition des apothécies) sur de nombreuses placettes (Chavannes -18-, Lizeray, Brives, Paudy -36-).

On est actuellement en début de risque contamination par le sclérotinia, à éviter par un traitement préventif dès que possible. Les trèfles incarnats, plus sensibles, sont à protéger impérativement.

Les produits homologués pour l'usage "culture porte-graine mineure"-traitement des parties aériennes-maladies diverses" (maladies à scléroties) sont à base d'imides cycliques :

- iprodione (ROVRAL AQUA Flo),
- procymidone (KIMONO, SUMISCLEX Liquide).



Suivi JNO 2002 : technique des pots pièges

Fleury les Aubrais (45)

Exposition	% de plantes avec puceron 2002 (2001)	Nbre de pucerons /plante atteinte		% de pots avec pucerons	
		2001	2002	2001	2002
01/10 au 08/10	99% (11%)	1,9	8,0	18%	100%
08/10 au 15/10	99% (9%)	2,2	6,3	38%	1
15/10 au 23/10	29% (7%)	2,6	2,4	43%	0,8
23/10 au 30/10	15% (21%)	1,8	1,9	29%	0,5
30/10 au 06/11	10% (28%)	3,0	2,9	63%	0,35

Bonneval (28)

Exposition	% de plantes avec puceron 2002 (2001)	Nbre de pucerons /plante atteinte		% de pots avec pucerons	
		2001	2002	2001	2002
01/10 au 08/10	50% (3%)	1,3	3,1	15%	95%
08/10 au 14/10	59% (0%)	0,0	3,1	0%	100%
14/10 au 21/10	4% (17%)	2,6	2,0	65%	20%
22/10 au 28/10	2% (21%)	3,2	2,5	65%	5%
28/10 au 06/11	2% (3%)	1,0	2,0	15%	10%